

# JOURNAL

für

## ORNITHOLOGIE.

Elfter Jahrgang.

Published on  
April 1864.

N<sup>o</sup>. 66.

November.

1863.

### Ueber eine neue Art von *Spermestes* aus Inhambane.

Von

W. Peters.

#### *Spermestes rufodorsalis* n. sp.

*Sp. capite, collo, pectore, rectricibus pedibusque nigris; auchenio, interscapulio, tergo, tectricibus, remigum secundariarum apicibus rufis; remigibus fuscis, in margine externo ex parte nigris albo guttatis vel fasciatis, interno ex parte albis; uropygio, hypochondriis, tibiisque nigris albo-fasciatis; abdomine subalaribusque albis; rostro caerulescente albo.*

Long. tot. 0<sup>m</sup>,090; rostr. 0<sup>m</sup>,010; al. 0<sup>m</sup>,047; caud. 0<sup>m</sup>,032; tars. 0<sup>m</sup>,0135.

Habit. Inhambane, Africa orientalis.

Die beiden in meiner Sammlung befindlichen männlichen Exemplare erlegte ich am 22. Juli 1846 in Inhambane, wo sie von den Bewohnern „tengatenga“ genannt werden, zusammen mit dem von Heuglin in Abyssinien beobachteten *Spermestes scutatus* Heugl. (der östlichen Form des westlichen *Sp. cucullata* Swains.), welche dort naháidsche genannt wird.

Sie ist am nächsten verwandt mit *Sp. poensis* Fras., welche sich aber durch die schwarze Farbe aller Theile, welche hier braun sind, leicht unterscheiden lässt.